



Kingstar RZ



تحمل الأمراض

• عالي التحمل لمرض البياض الدقيقي (Px)
و الكلاوسبوريوم (Ccu)

• متوسط التحمل لفيروس موزايك الخيار (CMV)
و فيروس إصفرار عروق أوراق الخيار (CVVW)



الثمار

- الثمار ذات تجانس عالي ، مضلعة و ذات لون أخضر متوسط
- نسبة كبيرة من الثمار من الدرجة الأولى و تتميز بأن لها القدرة على تحمل فترة التخزين
- معدل طول الثمار ١٧ سم



النبات

- كينغ ستار آر زد صنف خيار هجين
- مناسب للزراعة الخريفية المتأخرة و كذلك للزراعة الشتوية في المناطق ذات الشتاء الدافئ تحت البيوت البلاستيكية
- النبات ذو نمو متوازن ، قوي و الأفرع الجانبية متوسطة الطول
- النبات يحمل ١-٢ ثمار لكل عقدة
- يتميز كينغ ستار آر زد بعنق طويل للثمرة مما يسهل عملية القطف و يعطي عمر أطول للثمار بعد القطف



RIJK ZWAAN

Sharing a healthy future

Rijk Zwaan Export B.V. | E: mena@rijkszwaan.com | www.rijkszwaan.com

seeds&sharing

كينغ ستار آر زد

وقت التقليم

- ينصح بالقيام بكافة أعمال التقليم و إزالة الفروع الجانبية في الصباح الباكر و ذلك لأن قوة الشد داخل الخلايا تكون أعلى ما يمكن مما يسهل كسر الفروع
- أما بالنسبة لعمليات لف النبات على الخيط فيفضل أن تكون في فترة ما بعد الظهر



الحصاد		الزراعة					جدول مواعيد الزراعة و الحصاد				
كانون أول	تشرين ثاني	تشرين أول	أيلول	أب	تموز	حزيران	ايار	نيسان	أذار	شباط	كانون ثاني

إن مواعيد الزراعة و الحصاد في الرزنامة اعلاه هي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بشكل عام ، و لمعرفة الموعد الأنسب للزراعة في منطقتك المحددة ، فإننا ننصح باستشارة موزع بذور رايك زوان في منطقتك

إن تعليمات مواعيد زراعة الأسمانف و حصادها المبينة في هذه النشرة و المطبوعات الأخرى المشابهة، قد أعدت بكل دقة و أمانة قدر المستطاع بالإعتماد على نتائج التجارب و الزراعات الحقلية.. مع كل ذلك فإن النتائج النهائية التي سيحصل عليها المزارع تعتمد على الكثير من الشروط الزراعية و الظروف المناخية السائدة محليا خلال حياة المحصول. لذلك فإن شركة رايك زوان راع ضماناتها لعودة أصنافها و لكن تحت أي ظرف من الظروف فإنها ليست مسؤولة عن النتائج النهائية للمحصول