

Nykran بندورة كلاستر نيكران



Resistances المقاومات	TmVF ₂ (N) متحمل للنيماطودات و فيروس
Plant Vigor قوة النبات	Medium-high plant vigor متوسط - عالي المجموع الخضري
Setting العقد	Good setting in fall-winter and early spring conditions عقد جيد في الخريف الحار والشتاء والربيع
Cluster العنقود	Regular, symmetric, uniform cluster till the top; big stem العنقود منتظم متماثل متجانس حتى النهاية ذات ساق قوي
Fruits Cluster ثمار العنقود	8-6 nice fruits\cluster جذابة عدد الثمار على العنقود 6-8 حبات
Fruit الثمرة	M-G size , 130-120 gr. X fruit, good fruit attachment, dark green sepals الحجم متوسط إلى كبير بمعدل 120-130 غم مع التصاق قوي للثمار بالعنقود
Color اللون	Good red shiny color لون احمر لامع
Firmness الصلابة	Excellent firmness للثمار صلابة عالية
Skin defects القشرة الخارجية	Good tolerance to cracking and blotchy تحمل عالي للتشققات و مرض عفن الطرف الزهري
BER مرض البكتيريا	less sensitive to BER اقل حساسية للإصابة بالبكتيريا
Earliness التبكير	some days (15-10) early from the market leader variety أبكر ب 10-15 يوم من الصنف السائد في السوق
Taste المذاق	v. good taste مذاق مميز
Cycle (planting) موعد الزراعة	From end of Sept. to Mar. من نهاية شهر 9 وحتى شهر 5
Remarks	no sensitive to Botrytis لا يوحده حساسية لمرض العفن البني