



Agassi RZ



تحمل الأمراض

عالي التحمل لمرض الفيوزاريوم سلالة : واحد

(Foc : 1)

الرأس

- الرأس يأخذ شكل القبة المرتفعة ، كثيف ، منتظم و عالي التجانس
- تتراوح كثافة زراعة أجاسي آر زد بين ٣٠-٣٥ ألف نبات / هكتار
- عدد الأيام التي يحتاجها الصنف حتى موعد الحصاد تتراوح بين ٧٠-٧٥ يوم من تاريخ زراعة الأشتال في الحقل و لكن هذا يعتمد على حجم الرأس المرغوب به للتسويق و كذلك على الظروف الجوية السائدة خلال فترة النمو

النبات

- أجاسي آر زد صنف بروكولي هجين
- مناسب للزراعة الربيعية و الصيفية
- يتميز بتحملة لدرجات الحرارة المرتفعة و إنتاجيته العالية



Sharing a healthy future

- حيث أن صنف أجاسي آر زد مناسب للزراعة الربيعية و الصيفية فإنه من الضروري القيام بعملية الحصاد في الوقت المناسب نظرا للظروف الجوية الصعبة خلال موسم الصيف عادة و أن أي تأخير في موعد الحصاد سوف يؤثر سلبا على جودة المنتج



جدول مواعيد الزراعة		الزراعة									
يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر

إن مواعيد الزراعة في الرزنامة أعلاه هي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بشكل عام ، و لمعرفة الموعد الأنسب للزراعة في منطقتك المحددة ، فإننا ننصح باستشارة موزع بذور رايك زوان في منطقتك

إن تعليمات مواعيد زراعة الأصناف المبينة في هذه النشرة و المطبوعات الأخرى المشابهة، قد أعدت بكل دقة و أمانة قدر المستطاع بالإعتماد على نتائج التجارب و الزراعات الحقلية. مع كل ذلك فإن النتائج النهائية التي سيحصل عليها المزارع تعتمد على الكثير من الظروف المناخية السائدة محليا خلال حياة المحصول. لذلك فإن شركة رايك زوان رعم ضماناتها لجودة أصنافها و لكن تحت أي ظرف من الظروف فإنها ليست مسؤولة عن النتائج النهائية للمحصول